

Péptido: TIRZEPATIDE

Concentración: 20 / 40 / 60 mg

Categoría: Reducción de peso • Control metabólico • Acción dual.

Presentación liofilizada (Polvo). Uso Inyectable.

Es necesario agua bacteriostática para su preparación y uso.

Función principal:

Péptido de acción dual que activa simultáneamente los receptores GIP y GLP-1, modulando dos rutas metabólicas clave.

Aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce el apetito, mejora la saciedad y potencia la quema de grasa de manera más profunda que los agonistas exclusivos de GLP-1.

Propiedades funcionales observadas

- Modula dos rutas metabólicas clave (GIP y GLP-1).
- Reduce el apetito y mejora la saciedad.
- Apoya el control glucémico.
- Favorece una pérdida de peso profunda y sostenida.

Ámbitos de interés clínico

- Protocolos relacionados con obesidad o sobrepeso.
- Estrategias coadyuvantes a resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.
- Protocolos de control de peso y optimización metabólica.
- Situaciones de respuesta insuficiente a análogos tradicionales de GLP-1.



Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco. Una vez reconstituido el producto, mantener en refrigeración.

Consideraciones: Los efectos metabólicos suelen observarse de manera progresiva a lo largo de varias semanas, con optimización en protocolos sostenidos. Evitar si existe historial de carcinoma medular de tiroides o alergia al activo. No usar en embarazo ni lactancia. Puede potenciar el efecto de medicamentos para diabetes y retrasar el vaciamiento gástrico, lo que puede modificar la absorción de otros fármacos. Puede causar molestias digestivas.